И все-таки они вертятся!

Среда, 30 сентября
Конференц-зал ИЦИГ

Публичная лекция
Светланы Фёдоровой

**Жгутики и реснички –
биологические моторы**

терминология

- Жгутики (flagellum, flagella)
 - Реснички (cilium, cilia)
- специализированные органоиды движения клеток

эукариоты

Реснички

>100 шт на клетку
Длина < 20 мкм

Жгутики

До 5 шт на клетку
Длина > 20 мкм

прокариоты

Жгутики

Жгутики бактерий

Как происходит движение бактерии

E. coli 16000 об/мин

Хемотаксис

methyl-accepting chemotaxis proteins;
MCPs

Питательных
веществ нет

CheA CheB CheZ CheR
CheW ↑ CheY ↓

верчение
на месте

Аттрактанты

CheY ↑↑↑

прямолинейное
движение

Остановка движения (пленочные бактерии)

Белок **EpsE** размыкает ротор (**FliG** в составе мотора) и протоновый канал (*MotA/MotB*), в результате мотор больше не вращает жгутик, но сам он способен вращаться пассивно под воздействием внешних сил.

Жгутики и реснички эукариот

Жгутик или ресничка в разрезе. Интрафлагеллярный транспорт (IFT)

Базальное тело только фиксирует жгутик в клетке, оно не вращается!

Строение жгутика

Аксонема жгутиков

9+2:

9 парных микротрубочек (дублетов)

+ 2 непарные

Движение жгутиков и ресничек

3 основных гипотезы:

1. Механическая – «geometric-clutch hypothesis»
2. Ферментативная – «CP-spoke axis»
3. Осцилляторная – «dynein cross-bridge cycle»

1. Механическая – Гипотеза геометрического сцепления «geometric-clutch hypothesis» (Lindeman 1994)

- Изгиб жгутика растягивает нексиновые связи, что приводит к возникновению перпендикулярной изгибу силы (t-force), которая сжимает дублеты.
- Тогда динеин связывается с соседним дублетом и в присутствии Mg-ATP , скользит вдоль него, формируя продольную силу
- Продольная сила, вместе с T-силой, создает крутящий момент.
- Если T-сила становится слишком большой, то динеин отрывается от прилегающих микротрубочек и цикл повторяется.
- Механика такого движения зависит от кривизны изгиба жгутика, которая может сильно отличаться локально.
- «-» как начинается изгиб?

2. Ферментативная – Ось «спицы-центральные микротрубочки» (CP-spoke axis), Omoto and Kung, 1980

Одноклеточные:

- Центральная пара микротрубочек (CP) вращается, как ротор
- Белок Hydin взаимодействует с головками спиц, активируя (или деактивируя) динеин соответствующего внешнего дублета
- Создается активная зона дублета (на рис. – дублеты 7-9), что приводит к изгибу жгутика

Многоклеточные :

- Центральная пара микротрубочек (CP) НЕ вращается:
- Сдвиг между белком Hydin и головками спиц активирует сборку киназных комплексов на спице
- Киназные комплексы модулируют активность динеина, что может привести к его скольжению ВДОЛЬ дублетов
- Если скольжение противоположных дублетов разнонаправленное, то происходит изгиб жгутика

3. Осцилляторная гипотеза – «dynein cross-bridge cycle» (Sugino и Naitoh, 1982)

cross-bridge cycle :

- каждый динеин прикрепляется к микротрубочке, скользит по ней, и отрывается
- Если все динеины активируются последовательно, происходит биение реснички
- «-» амплитуда шага динеина всего 16 нм,
- Этого мало для биения!

A Beat cycle

B Dynein cross-bridge cycle

Определение левой и правой стороны

Человек:

1:8000 - аномалии установления лево-правой асимметрии органов

1:20000 - *situs inversus* - полная инверсия органов

- Млекопитающие - гензеновский узелок

- Рыбы – купферовский узелок

- Амфибии – шпемановский организатор

Зародыш мыши на стадии 8,25 дня, вид слева: передняя часть — А, задняя — Р, буквой L отмечена левая боковая пластинка. Внизу виден гензеновский узелок (node).

этап 1 — потеря симметрии
(~7.5 дней развития эмбриона мыши)

nodal flow -

ток жидкости в гензеновском узелке:

~600 биений в минуту -

причина потери билатеральной симметрии

Гензеновский узелок эмбриона мыши с увеличением 600 (*вверху*) и 6000. **A** и **P** — передняя и задние части эмбриона, **L** и **R** — левая и правая половины тела. *Стрелкой* на верхней фотографии обозначено направление движения жидкости, на нижней фотографии отмечена ресничка

Молекулы или механика?

1. Гипотеза морфогена
(Nonaka, 1998)

2. Биомеханическая гипотеза (Мартина Брюкнер, 2003)

Внутри узелка – подвижные реснички, по периферии – механосенсоры

nodal flow

PKD2

Ca²⁺ ↑↑↑

Сигнальные каскады

этап 2 — реализация асимметрии
(~ с 8 дня развития эмбриона мыши)

гены с асимметричной экспрессией

Nodal ***Ablim1***

морфогены

Ptx2

специфические морфологические структуры

Сигнальный каскад Nodal-Ptx2 = каскад латеральности («левосторонности»).

Цилиопатии

**Поликистоз
почек**

Строение почки человека

Почечные каналцы, заполненные фильтрационной жидкостью, раздуваются, сдавливая область гломерул (фильтрационных клубочков)

Белковый комплекс полицистин

PKD1= полицистин-1

PKD2= полицистин-2

Germino & Ikedaより引用

Noel S Murcia, William E Sweeney Jr and Ellis D Avner. New insights into the molecular pathophysiology of polycystic kidney disease. *Kidney International* (1999) **55**, 1187–1197

Неподвижные реснички